



Implanty w strefie estetycznej – opcje chirurgiczne na etapie fazy protetyki

Odbudowa na implantach jest procesem wieloetapowym, który rozpoczyna się przed wszczepieniem implantu i trwa przez fazę chirurgicznego wszczepienia implantu i wyłonienia implantu, a kończy się na opracowaniu protezy. Rezultat spełniający oczekiwania funkcjonalne i estetyczne pacjenta wymaga staranności na każdym z tych etapów.

Czasami nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności na etapie chirurgicznym zespół zajmujący się odbudową staje w obliczu sytuacji anatomicznych, które – z powodu wad tkanek miękkich lub kości – uniemożliwiają opracowanie zadowalającej odbudowy. Czasami komplikacje pojawiają się po zamocowaniu protezy.

Celem tej prezentacji jest przedstawienie takich sytuacji, nauczenie się, jak je oceniać, oraz omówienie opcjonalnych procedur chirurgicznych pozwalających rozwiązać tego rodzaju problemy albo przy najmniej rozwiązać je częściowo.

Prof. Moshe Goldstein, DMD



Dyrektor studiów podyplomowych z periodontologii na Wydziale Stomatologii Centrum Medycznego Uniwersytetu Hebrajskiego Hadassah-Hebrew w Jerozolimie (Izrael).

Prof. Goldstein ukończył Wydział Stomatologii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie w 1986 r. Studia podyplomowe z zakresu periodontologii odbył w latach 1986–1990 w Centrum Medycznym Uniwersytetu Hebrajskiego Hadassah-Hebrew w Jerozolimie, które zakończyły się uzyskaniem dyplomu specjalisty z zakresu periodontologii w 1990 r. Prof. Goldstein jest byłym prezesem Izraelskiego Towarzystwa Periodontologicznego i byłym przewodniczącym Rady Periodontologicznej Izraelskiej Naukowej Rady Stomatologicznej. Przez ostatnie cztery lata był członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Periodontologii, a w 2012 r. piastował stanowisko prezesa tej organizacji. Wygłaszał wykłady i publikował prace na całym świecie, na różne tematy, takie jak chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w periodontologii oraz zarządzanie implantami w pozycjach atroficznych i problematycznych.